




الثقب بين البطينات (ثقب الحاجز البطيني) VENTRICULAR SEPTAL DEFECT

سلسلة أمراض القلب الخلقية ٢




ما هي وظيفة الحاجز بين البطينات؟

يغصل الحاجز البطيني بين البطين الأيسر واليمين، مما يمنع اختلاط الدم المشبع بالأوكسجين القادم من الرئتين إلى البطين الأيسر، بالدم قليل الأشعة بالأوكسجين القادم من أوردة الجسم إلى البطين اليمين.



ما هي التغيرات المرضية التي يسببها وجود الثقب بين البطينات؟

يعتبر الثقب بين البطينات من أكثر تشوهات القلب الخلقية شيوعاً لدى الأطفال، حيث تشكل نسبة ٣٪ من تشوهات القلب الخلقية.
 في حال وجود ثقب بين البطينات، فإن جرأة من الدم الموجود في البطين الأيسر يعبر من خلال الثقب وتحت بطانة عالي إلى البطين اليمين ومنه إلى الشريان الرئوي ثم الرئتين، ومن ثم يعود إلى الجهة اليسرى من القلب (الأذين الأيسر والبطين الأيسر).
 هذه العملية تتسبب في التغيرات المرضية التالية:
 مرور كميات أكبر من الدم إلى الرئتين يؤدي لاحتقان الرئتين مما يحول دون إتمام عملية تبادل الأوكسجين وتأتي أكسيد الكربون بشكل ملائم بين الدووصلات الهوائية والشعيرات الدموية، وهذا مما يتسبب لاحقاً بصعوبة في التنفس لدى الطفل.
 تكون البطين الأيسر يتعامل مع كميات إضافية من الدم، مما يؤدي لتوسيعه وإجهاده، وبمرحلة تالية قد يصاب المريض بفشل وقصور يوظائف القلب.
 مع الوقت، ونتيجة تعرض الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين لكميات زائدة من الدم وتحت ضغط عال (وهي بالأصل غير مهيأة لذلك)، قد يصاب بهذه الأوعية بأضرار تتسبب في انتفاض ضغط الدم الرئوي.
 لا يشترط أن كل طفل لديه ثقب بين البطينات يتعرض لاما سبب ذكره، بل تتفاوت هذه النتائج بشكل كبير حسب عمر الطفل وحجم الثقب إضافةً لوجود تشوهات خلقية أخرى أيضاً.



ما هي الأعراض الناجمة عن وجود ثقب بين البطينات؟

إذا كان حجم الثقب صغيراً فلا يتوقع أن يعاني الطفل من أي مشكل صحي.
 إذا كان حجم الثقب متوسطاً أو كبيراً، فقد يلاحظ على الطفل بعض علامات التعب والإجهاد، إضافةً لصعوبة في التنفس و خاصة عند القيام بمجهود عظيم كاللعب مع الأطفال أو ممارسة الرياضة. أما إذا كان الطفل رضيعاً، فيبعد عن التجاويف الشهر الأولى من العمر قد يلاحظ عليه سرعة التنفس، والتعرق، حصوله على الرضاعة، وقد لا يتمكن من إكمال الرضاعة مما يؤدي لقطعها. تأخذ الطفل سلس من الراحة. قد يصاب الطفل بالتشهيات متكررة بالشعب الهوائية مما يستلزم زيارة الطبيب أو حتى دخول المستشفى للعلاج، بمرحلة تالية وفي حال غياب المعالجة قد يصاب الطفل بضعف الملو.



ما المقصود بالتهاب شفاف القلب؟

هو التهاب حليمي نادر لكنه خطير يصيب الغلاف الداخلي للقلب بما فيه صمامات القلب و يتطلب العلاج داخل المستشفى لفترة طويلة، ولوفقاً منه قد يستلزم إعطاء جرعة واقية من المضاد الحيوي للقضاء على البكتيريا ٦-١٠ دقيقة قبل إجراء بعض الادخلات الجراحية بما في ذلك عمليات الأسنان.



ما هو علاج الثقب بين البطينات؟

ينتفت العلاج حسب حجم القلب، ويمكنه ووجود عيوب خلقية أخرى، إضافةً لعمر الطفل، والمضاعفات الصحية التي يعاني منها.
 أغلب التفقوب الصغيرة تتعلق من تقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخل، و حتى إن لم تغلق تماماً هو الحال في بعض الحالات، فيمكن للأطفال بعضهم مشكلاً طبيعياً مع وجود التفقوب.
 أغلب التفقوب التي تكون بعيدة عن مدخل أو مخرج البطين تتعلق من تقاء نفسها دون الحاجة إلى أي تدخل.

كلما كبر حجم التفقوب، كلما قلت نسبة انتقال من تقاء نفسها للأقوب التي تكون على مدخل أو مخرج البطينات عادة لا تقبل من تقاء نفسها.
 كلما كبر الطفل و زاد وزنه، كلما كان التداخل الجراحي أسهل و نسبة نجاحه أكبر و فترة بقاء الطفل بالمستشفى أقصر.

لتقوب متوسطة الحجم قد تغلق من تقاء نفسها مع مرور الوقت ولكن بنسبة أقل، ولكن قد يحتاج الطفل تناول بعض الأدوية التي تساعد القلب في عمله وتخفيف العبء عليه وتنمية حدود فشل وظائف القلب أو فشل النمو فلا بد من إحلالها جراحتاً.
 مما يؤدي إلى الوفاة.



سلسلة أمراض
القلب الخلقية

لتقوب كبيرة الحجم قد تغلق من تقاء نفسها و لا بد من إحلالها جراحتاً بالأشهر الأولى من العمر، و عادة ما يتطلب من الطفل تناول الأدوية المساعدة إلى حين يتم إغلاق التفقوب جراحتاً.

في بعض الأحيان (مثل إذا كان وزن الطفل صغيراً، أو وجود تقوب متعدد...) قد تلجأ لخط الشريان الرئوي كمرحلة أولى لتفحيف احتقان الرئتين، وبمرحلة تالية يتم إغلاق التفقوب جراحتاً.
 في الحالات الخاصة، يمكن إغلاق بعض التقوب بجهار خاص عن طريق قسطرة القلب العلاجية.