



معلومات عامة لوالدي الطفل قبل عملية إصلاح فتحة البول (الذكر) أو ناصور بولي

قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد الجامعي
وحدة جراحة المسالك
عيادة جراحة مسالك الأطفال
التثقيف الصحي

قبل الخروج للبيت.

ما هو متوقع في البيت :

قد يشعر الطفل بعدم الراحة والألم الخفيف ممكن اعطاؤه البنادول لكي يسكن له الألم.
لا توجد قيود معينة حول نوعية الأطعمة ولكن ينصح بأخذ كمية جيدة من السوائل.
لا يسمح ان يمارس الطفل نشاطات عنيفة .
عمل مغطس مائي ثلاث مرات باليوم.

العودة للمدرسة :

ممكن ان يعود للمدرسة اذا كان مرتاحاً ويمنع من اللعب في حصة الرياضة لمدة اسبوعين.

تعريفات / مصطلحات

القسطرة :-

هي أنبوب (لي) تقوم بأخراج البول من المثانة إلى كيس البول

المثانة :-

عبارة عن وعاء يتجمع فيه البول

مع تمنياتنا لكم بالشفاء التام
قسم المسالك البولية - الاطفال

معلومات عامة لوالدي الطفل قبل عملية إصلاح فتحة البول (الذكر) أو ناصور بولي

الهدف من العملية :

١. تعديل انحناء القضيب الذكري إن وجد.
٢. تحريك فتحة البول باتجاه أعلى الذكر.
٣. صفة تجميلية.
٤. عمل ختان.

تعليمات الصيام قبل العملية :-

١. الأطفال لمن هم فوق سنتين
 - لاشئ صلب مثل (البسكويت - الفواكه) بعد منتصف الليل
 - سوائل صافية مثل (عصير التفاح - حلي - ماء) لغاية ٦ ساعات ما قبل العملية
 ٢. الأطفال الرضع
 - إذا كان الطفل يأخذ الحليب عن طريق الزجاج (الرضاعة) يمكن إعطاؤه الحليب قبل ٦ ساعات من العملية
 - إذا كان الطفل يرضع من صدر والدته يمكن إعطاؤه الوجبة الأخيرة من الحليب قبل العملية بـ ٤ ساعات.
- الاتصال بقسم التنويم أو المنسقة يوم الإثنين السابق للعملية من الساعة (٨ ص - ٢ م) للحصول على معلومات أكثر وتأكيد الموعد.

مدة المكوث في المستشفى :-

بعد العملية بيوم أو اثنين يخرج الطفل بالقسطرة إلى المنزل ويعود بعدها بموعد إلى المستشفى لإزالتها وعمل الغيار اللازم ولكن قد يتطلب في بعض الأحيان مكوث الطفل لمدة تتراوح بين ٤-١٠ أيام في المستشفى.

مباشرة بعد العملية / طفلك سيحتاج :-

- يحتاج سوائل كافية عن طريق الوريد في اليوم الأول بعد العملية ثم يستطيع الطفل تناول الوجبات العادية في اليوم التالي مع اعطاء كمية كافية عن طريق الفم.
- بعد العملية يكون لديه قسطرة بولية مع فتحه البول وذلك لإخراج البول من المثانة وتزال

القسطرة بعد العملية بـ ٢-٤ يوم.

- بناء على تعليمات الطبيب عمل مغطس مائي لمدة ١٠ دقائق ٣-٤ مرات يومياً (يتكون المغطس من ماء دافئ + ملعقة من الملح الخشن).
- يأخذ الطفل علاجاً إذا كان متألماً حسب تعليمات الطبيب.
- ممكن أن تلاحظ الأم أن الطفل لديه شعور بالغثيان بعد العملية وذلك من آثار التخدير ويمكن إعطاؤه علاج لذلك.

ماذا نتوقع في الأيام التالية :-

على الطفل أن يمكث في السرير حتى إزالة القسطرة.

سيخرج البول خلال القسطرة المثبتة في الذكر ولن يحتاج الطفل للبول حتى ولو شعر بذلك وقد يشعر الطفل برغبة شديدة للبول مع ضم الفخذين ووجود ألم تحت السرة وهذا ما يطلق عليه اسم تقلص المثانة نتيجة لوجود القسطرة بها ويتم إعطاؤه أدوية لتخفيف هذا الشعور ، وبعد إزالة القسطرة قد يشعر ببعوض الآلام عند التبول ولكنها ستزول فيما بعد.

من المتوقع حدوث تورم في القضيب بعد العملية وبعض الإفرازات وهذه أمور طبيعية متوقعة وستحسن مع مرور الوقت بأذن الله في خلال الثلاث أسابيع الأولى بعد العملية.

المعلومات التي يحتاجها المريض عند الخروج من المستشفى بعد عملية (إصلاح الذكر)

١. تناول وجبات طعام عادية
 ٢. التشجيع (الإكثار) من أخذ السوائل مثل العصائر - الماء
 ٣. عدم لبس الملابس الضيقة ولبس الملابس المريحة في المنزل
 ٤. عدم ممارسة التمارين الرياضية العنيفة مثل (ركوب الدراجة ، اللعب بالكرة ،) على الأقل مدة شهرين بعد العملية
 ٥. وضع مرهم خاص (حول الذكر) لمنع الجفاف ومنع الالتصاق بالحفاظ
 ٦. عمل مغطس مائي لمدة ١٠ دقائق في حالة عملية إصلاح فتحة البول وذلك بأحضار (٢-٣) لتر ماء دافئ + ملعقة كبيرة من ملح الطعام ويراعى وضع اليد في الماء قبل انزال الطفل حتى لا يتعرض الطفل للحرق في حالة كان الماء ساخناً أكثر من اللازم وذلك يومياً ثلاث مرات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد الخروج من المستشفى.
 ٧. الاتصال بالطبيب أو الحضور للإسعاف والطوارئ مباشرة في حالة:-
ارتفاع الحرارة ، النزف في مكان العملية ، الألم الشديد ، التورم الشديد ، الاحمرار ، صعوبة شديدة في التبول ، رائحة كريهة مكان العملية أو مكان أنبوب التصريف.
- التأكد من أخذ موعد جديد للعيادة أو إذا كان هناك مواعيد للأشعة والفحوصات المخبرية والعلاجات