


متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS)



وحدة العقم والإنجاب
إشراف رئيسة قسم الوحدة الاستشارية
د. هند أحمدوه

أ. محمد سعيد الشهري
رئيس قسم الجودة وسلامة المرضى

Mohammad Saeed Alshehri
Quality and Patient Safety HOD




المراجع

ترجمة كتاب أمراض الغدد الصماء
النسائية السريية والعقم، للمؤلف
ليون سبيروف ، الإصدار التاسع.


ماهي متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS)؟

هي متلازمة طبية تحدث لبعض النساء الآتي
يتناولن أدوية تنشيط المبيض وخاصة الابز ،
والسيدات اللاتي يعانين من تكيسات
المبايض سواء بدينات او نحيفات ، ونادراً جداً
لبعض النساء دون تناول أدوية، وتظهر معظم
الحالات بشكل بسيط ، ونادراً ما تكون الحالة
شديدة بشكل يمكن أن يؤدي الى مرض خطير
يهدد الحياة




تصنيفات المتلازمة وأعراضها أ- الدرجة البسيطة الى المتوسطة الخطورة

الم بسيط الى متوسط في البطن
انتفاخ البطن أو زيادة حجم الخصر
الغثيان والقيء
الاسهال
ألم في منطقة المبايض



ب - الدرجة الشديدة الخطورة

زيادة سريعة في الوزن أكثر من 1 كغ في
خلال ٢٤ ساعة
الم شديد في البطن
الجلطات الدموية
قلة التبول
ضيق النفس
انتفاخ وتضخم البطن




تشخيص متلازمة فرط تحفيز المبيض

1- الفحص السريري : من خلال البحث عن زيادة الوزن وزيادة حجم الخصر وآلام البطن.




2- الموجات فوق الصوتية التي تظهر أن حجم المبايض أكبر من المعتاد مع وجود أكياس كبيرة مملوءة بسائل .



3- اختبار الدم وذلك للتأكد من وظيفة الكلى اذا كانت تتعرض لضعف بسبب متلازمة فرط تحفيز المبيض، وهذيا لاختبارات تشمل :


- تحليل مستوى الهيموجلوبين بالدم (HB)
- تحليل مستوى الهيماتوكريت بالدم (HCT)
- تحليل مستوى الاستروجين (E2)
- تحليل مستوى هرمون الحمل بالدم (HCG)



العلاج

يعتمد علاج متلازمة فرط تحفيز المبيض على شدة الحالة، ويمكن علاج متلازمة فرط تحفيز المبيض الخفيفة بشكل متحفظ من خلال مراقبة محيط البطن والوزن حتى حدوث الحمل أو الحيض. ويمكن أن يتسبب الحمل في تفاقم شدة الحالة. يتم التعامل مع متلازمة فرط تحفيز المبيض المتوسطة بالراحة في الفراش والسوائل والمراقبة الدقيقة بالمختبرات المعملية مثل معادن الجسم وتعداد الدم، كما يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لمراقبة حجم حويصلات المبيض، كما قد يراقب الطبيب -بحسب الحاجة- كمية السوائل الداخلة والخارجة من الجسم، بحثاً عن أي اضطراب في توازن السوائل، ويشير النقص المتتالي في حجم الحويصلات إلى الشفاء من المتلازمة.

أحياناً يكون من الضروري شفط السوائل المتراكمة في التجويف البطني أو الجنب، وكذلك إعطاء الأم مواد أفيونية لتسكين الألم. أما إذا تطورت متلازمة فرط التنبيه المبيضي أثناء بروتوكول التلقيح الاصطناعي، فقد يكون من الحكمة تأجيل نقل الأجنة السابقة لأن الحمل يمكن أن يطيل وقت الشفاء أو يزيد من شدة المتلازمة.



صور لمريضة تعاني من زيادة ملحوظة في محيط البطن بسبب متلازمة فرط تحفيز المبيض . الدرجة شديدة الخطورة. (الصور مقتبسة من Researchgate) .